



La presencia del **Cáncer Cervicouterino** en México



Es un tipo de cáncer que se produce en las **células del cuello uterino**, la parte inferior del útero que se **conecta a la vagina**.¹



En México, durante el 2022 se registraron **10 mil 348 nuevos casos** de cáncer cervicouterino, siendo el **segundo cáncer más frecuente en mujeres**.²



El cáncer cervicouterino fue la causa de **4 mil 909 decesos** a nivel nacional durante el 2022.²



Tener **relaciones sexuales a una edad temprana** aumenta el riesgo de contraer el virus del papiloma humano.





Tener otras infecciones de transmisión sexual, como **la clamidia, la gonorrea, la sífilis y el VIH/sida**, aumenta el riesgo de contraer el virus del papiloma humano.

Consulte a su médico.

Referencias

1. Mayo Clinic: Cáncer cervicouterino. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/cervical-cancer/symptoms-causes/syc-20352501#> Consultado el 14 de febrero de 2024.
2. GLOBOCAN MÉXICO. Disponible en: <https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/484-mexico-fact-sheet.pdf> Consultado el 14 de febrero de 2024



Principales signos y síntomas del Cáncer Cervicouterino





Las mujeres con precánceres y cánceres de cuello uterino en etapa temprana por lo general no presentan síntomas, los síntomas suelen comenzar hasta que el cáncer crece.¹






Los signos y síntomas más comunes de cáncer cervicouterino son:²







Manchas de sangre
o sangrado leve
entre o después de la
menstruación.



**Sangrado menstrual
que es más prolongado y
abundante que lo habitual.**




Sangrado después del coito, del lavado genital o del examen pélvico.



Mayor secreción vaginal.

Dolor durante las relaciones sexuales.




Sangrado después de la menopausia.






Dolor de
espalda
y/o pélvico
persistente
sin razón
aparente.



Algunos signos y síntomas observados en una etapa más avanzada pueden ser:¹




Hinchazón
de las
piernas




**Problemas para orinar
o para evacuar**



Sangre en la orina



Consulte a su médico.





Referencias:

1 ACS. Cáncer de cuello uterino. Disponible en: <https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-cuello-uterino/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/senales-sintomas.html> Consultado el 19 de julio 2023.

2 ASCO. Cáncer de cuello uterino. Disponible en: <https://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/cancer-de-cuello-uterino/s%C3%ADntomas-y-signos> Consultado el 19 de julio 2023.

D.R. © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., E.U.A. y sus afiliadas. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total. Merck Sharp & Dohme Comercializadora, S. de R.L. de C.V. Av. San Jerónimo 369, Col. La Otra Banda, C.P. 01090, Ciudad de México. 07-25 MX-KEY-01499